

Infoblatt Mutter Kind Pass-Untersuchungen

Für die MKP-Untersuchung werden folgende Röhrchen benötigt:

Untersuchung	Erforderliches Material	Bemerkungen
Blutgruppe + Rhesusfaktor und/oder RH-Antikörper-Suchtest, Coombstest (indir.)	1 violette EDTA-Röhrchen 6ml + 1 weißes Serumröhrchen	
Toxoplasmose und/oder Röteln-AK Hepatitis (HbsAg) Lues-Reaktion (TPHA) HIV	1 rotes oder gelbes Serumröhrchen	möglichst zentrifugiert
Erythrocyten Hämatokrit, Hämoglobin	1 violette EDTA-Röhrchen 2ml	
OGTT	gut zentrifugiertes, abgehobenes Serum bzw. Fluoridblut (rosa Röhrchen)	Patientin muss während d. Untersuchung in der Ordination bleiben: - Abnahme nüchtern - Belastung mit 75g Glucose - Abnahme nach 1 Std - Abnahme nach 2 Std (an den 3 vorangehenden Tagen muss eine kohlenhydratreiche Ernährung erfolgen)

Laboruntersuchungen während der Schwangerschaft:

- Bis 16. SSW:
- Erythrozytenzahl
 - Hämatokrit, Hämoglobin
 - Blutgruppe und Rhesusfaktor
 - Rhesus-Antikörper-Suchtest
 - Röteln-Antikörper-Titer
 - Lues-Reaktion (TPHA)
 - Toxoplasmose-Untersuchung
(Kontrollen bei negativem oder
abklärungsbedürftigem Erstbefund
erforderlich)

- 25.-28. SSW:
- Erythrozytenzahl
 - Hämatokrit
 - Hämoglobin
 - Hbs-AG
 - oGTT

Kontrollen falls erforderlich:

- indirekter Coombstest
- Toxoplasmose-Kontrolluntersuchungen

Weitere Untersuchungen:

- HIV